

Подготовка пациента к исследованию КТ с внутривенным болюсным введением РКВ.

1. За 1-2 дня до исследования исключаются из рациона питания продукты, способствующие повышенному газообразованию (черный хлеб, квашеные продукты, свежее молоко и др.).

2. В кабинет КТ пациент прибывает в строго назначенное время. При себе обязан иметь направление на исследование (с указанием даты и времени) и результаты анализов крови на уровень креатинина в плазме крови (давность – не более 30 дней).

3. За 24 часа до исследования с внутривенным контрастированием необходимо отменить применение нефротоксических препаратов (диуретики, метформин, глюкофаж, нестероидные противовоспалительные препараты, такие как вольтарен, ибупрофен, индометацин, диклофенак, целекоксиб, мовалис, кетанол, НАИЗ, нимесулид, нурофен).

4. За 2 часа до исследования больной начинает пить 2 литра жидкости (в любом виде, кроме газированной воды), мочиться можно (кроме исследования мочевого пузыря).

5. Необходимо взять с собой медицинскую документацию, относящуюся к зоне интереса: послеоперационную выписку, данные предыдущих исследований на дисках, таких как МРТ, КТ, УЗИ.

После исследования обильное питьё в течение дня.

Если у Вас возникли вопросы, не стесняйтесь задать их врачу-рентгенологу или рентгенолаборанту.

Подготовка пациента к исследованию МРТ с внутривенным болюсным введением РКВ.

1. За 1-2 дня до исследования исключаются из рациона питания продукты, способствующие повышенному газообразованию (черный хлеб, квашеные продукты, свежее молоко и др.).

2. В кабинет МРТ пациент прибывает в строго назначенное время. При себе обязан иметь направление на исследование (с указанием даты и времени) и результаты анализов крови на уровень креатинина в плазме крови (давность – не более 30 дней).

3. За 24 часа до исследования с внутривенным контрастированием необходимо отменить применение нефротоксических препаратов (диуретики, метформин, глюкофаж, нестероидные противовоспалительные препараты, такие как вольтарен, ибупрофен, индометацин, диклофенак, целекоксиб, мовалис, кетанол, НАИЗ, нимесулид, нурофен).

4. Перед магнитно-резонансной томографией не следует использовать декоративную косметику, крем, лак для волос.

5. Необходимо взять с собой медицинскую документацию, относящуюся к зоне интереса: послеоперационную выписку, данные предыдущих исследований на дисках, таких как МРТ, КТ, УЗИ.

После исследования обильное питьё в течение дня.

Если у Вас возникли вопросы, не стесняйтесь задать их врачу-рентгенологу или рентгенолаборанту.